

PREPARACIÓN E INDICACIONES

TOMOGRAFÍA DE ABDOMEN O ABDOMINOPELVIANA CON Y SIN CONTRASTE ENDOVENOSO

Estimado/a Paciente: Lea con atención y siga las instrucciones aquí detalladas para obtener óptimos resultados en sus estudios médicos.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Si padece o ha padecido afecciones alérgicas, coménteselo al médico y/o técnico previo al examen.
- Si se encuentra tomando medicamentos, no debe suspenderlos.
- Si Ud. presenta diabetes, insuficiencia renal o cardíaca o está embarazada, debe consultar previamente con su médico para adaptar la medicación de preparación.

SI UD. TIENE ESTUDIOS PREVIOS TALES COMO ECOGRAFÍAS, TOMOGRAFÍAS O RESONANCIAS MAGNÉTICAS, TRÁIGALOS EL DÍA DEL ESTUDIO EN FORMATO CD E INFORME.

PREPARACIÓN

Concurra al estudio con 8 horas de ayuno.

TOMA DE BENADRYL (GENÉRICO: DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO)

- 1) Tome una cápsula cada 8 horas durante los 2 días previos al estudio. Debe tomar como mínimo 6.
- 2) Durante la preparación, tome desayunos, almuerzos y cenas livianos.
- 3) Tome abundante cantidad de líquidos claros, no gasificados (puede tomar agua mineral, caldos colados, etc.)

TOMA DE CONTRASTE ORAL

Diluya el contenido en 1 litro de agua y comience a tomarlo 12 horas antes del estudio. Debe tardar 3 horas en terminar en el envase.

Importante: concurra con media hora de anticipación al turno.